



# Diriguj svoj prinos

Od 1876.

ULJANA  
REPICA



Najbolje iz Austrije

KATALOG  
2021

[www.rwa.co.rs](http://www.rwa.co.rs)





# NOVO

## KWARK

Nakon dve godine testiranja uljane repice **KWARK** na tržištu Srbije, s ponosom vam predstavljamo jedan od najprinosnijih hibrida u regionu!

**KWARK** je hibrid sa nešto sporijim rastom u jesen i proleće. Zbog ove karakteristike je pogodan za raniju setvu koja je dala najbolje rezultate kod ovog hibrida.

- ✓ Grupa zrenja: **Srednje kasna**
- ✓ Potencijal za prinos: **Veoma visok**
- ✓ Početni porast: **Ujednačen i sporiji kako u jesen tako i u proleće**
- ✓ Otpornost na zimu: **Jako dobra**
- ✓ Visina biljke: **Srednje visine**
- ✓ Čvrstoća stabljike: **Odlična**
- ✓ Otpornost na poleganje: **Veoma dobra**
- ✓ Otpornost na pucanje mahuna: **Odlična**
- ✓ Sadržaj ulja: **Visok oko 48% (na AST)**
- ✓ Setvena norma: **400.000 – 450.000 biljaka/ha**
- ✓ Vreme setve: **20. avgusta – 10. septembra**



PRINOS ZRNA sa 9% vlage	SADRŽAJ VLAGE u žetvi
3.121 kg/ha	8.3 %

PSS Subotica

PRINOS ZRNA sa 9% vlage	SADRŽAJ VLAGE u žetvi
3.469 kg/ha	7.8 %


PSS Sombor

PRINOS ZRNA sa 9% vlage	SADRŽAJ VLAGE u žetvi
3.400 kg/ha	5.8 %

PSS Bačka Topola

PRINOS ZRNA sa 9% vlage	SADRŽAJ VLAGE u žetvi
4.325 kg/ha	5.1 %

PSS Pančevo



OGLEDI ULJANE REPICE **KWARK** U 2020. GODINI  
NA PODRUČJU VOJVODINE




## RGT TREZZOR

RGT TREZZOR je hibrid najnovije generacije sa kojim ostvarujete rekordne prinose u svim uslovima proizvodnje.

### NAJPRODAVANIJI RWA HIBRID ULJANE REPICE U SRBIJI!

- ✓ Grupa zrenja: **Srednje rana**
- ✓ Potencijal za prinos: **Veoma visok**
- ✓ Početni porast: **Dobar**
- ✓ Otpornost na zimu: **Dobra**
- ✓ Visina biljke: **Srednje visoka**
- ✓ Čvrstoća stabljike: **Odlična**
- ✓ Otpornost na poleganje: **Odlična**
- ✓ Otpornost na pucanje mahuna: **Odlična**
- ✓ Sadržaj ulja: **Oko 44% (na AST)**
- ✓ Setvena norma: **450.000 – 500.000 biljaka/ha**
- ✓ Vreme setve: **20. avgusta – 20. septembra**



Najprofitabilniji hibrid uljane repice proglašen od strane privredne komore Gornje Austrije u 2017, 2018 i 2020 godini.



# NOVO

## TEMPTATION

**TEMPTATION** je prvi hibrid nemačke semenske kuće DSV, tolerantan na virus TuYV (Turnip yellow virus). Hibrid visoke fleksibilnosti, pogodan za sve uslove proizvodnje. Zbog izuzetno brzog početnog porasta, pogodan je za kasnije setve i setve izvan optimalnog roka.

**TEMPTATION** postiže izuzetno visok i stabilan prinos, dok je sadržaj ulja takođe na visokom nivou i kreće se oko 46,1%.

- ✓ Grupa zrenja: **Srednje kasna**
- ✓ Visina biljke: **Srednje visine**
- ✓ Početni porast: **Izuzetno brz**
- ✓ Otpornost na zimu: **Odlična**
- ✓ Čvrstoća stabljike: **Odlična**
- ✓ Otpornost na poleganje: **Odlična**
- ✓ Otpornost na pucanje mahuna: **Odlična**
- ✓ Sadržaj ulja: **Oko 46% (na AST)**
- ✓ Setvena norma: **400.000 – 450.000 biljaka/ha**
- ✓ Vreme setve: **20. avgusta do kraja septembra**
- ✓ Prilagodljiv svim uslovima gajenja. Takođe pogodan i za gajenje na teškim zemljištima.



Oficijalni ogledi ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u **2019.** godini

HIBRID	LOKALITET SOMBOR	
	PRINOS ZRNA sa 9% vlage (kg/ha)	SADRŽAJ VLAGE u žetvi %
Standard 1	4234	7.98
Standard 2	3079	8.15
Test 1	3665	8.00
<b>TEMPTATION</b>	<b>4690</b>	<b>6.73</b>
Test 2	4267	6.70
Test 3	4272	6.60

Oficijalni ogledi  
ministarstva  
poljoprivrede,  
šumarstva i  
vodoprivrede u  
**2020.** godini

HIBRID	LOKALITET NOVI SAD		LOKALITET SOMBOR	
	PRINOS ZRNA sa 9% vlage (kg/ha)	SADRŽAJ VLAGE u žetvi %	PRINOS ZRNA sa 9% vlage (kg/ha)	SADRŽAJ VLAGE u žetvi %
Standard 1	3974	7.15	2433	9.63
Standard 2	3954	7.03	2534	11.78
Test 1	3908	7.27	3469	7.83
Test 2	4075	7.28	2764	7.28
<b>TEMPTATION</b>	<b>4121</b>	<b>7.09</b>	<b>3511</b>	<b>8.05</b>

# RAPSAN PLUS<sup>®</sup>

## BUDITE UVEK U PLUSU!

**RAPSAN PLUS** je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje travnih i širokolistnih korova u uljanoj repici. Snažan herbicid koji u sebi sadrži dve aktivne materije. Na taj način postižemo potpunu zaštitu od korova, jer je **RAPSAN PLUS** moguće primeniti pre kao i nakon nicanja uljane repice.

### O PROIZVODU

#### Sastav (a.m.)

Metazahlor 333 g/l + Kvinmerak 83 g/l

#### Formulacija

Koncentrat za suspenziju (SC)

PAKOVANJE



1l  
5l

Efikasan herbicid **obezbeđuje sigurnost i stabilnost** u proizvodnji uljane repice

Primena	Preporučena doza/ha	Vreme primene	Karenca
Uljana repica	2 – 2,25 l	Posle setve, a pre nicanja (pre em.) ili nakon nicanja useva (post em.) do faze 3 lista	OVP

Ciljani korovi: Hoću-Neću (*Capsella bursa-pastoris*), pepeljuga (*Chenopodium album*), broćika lepuša (*Galium aparine*), gorčika rapava (*Sonchus asper*), mlečika rana (*Euphorbia helioscopia*), gorušica poljska (*Sinapis arvensis*), gorčika obična (*Sonchus oleraceus*), mišjakinja obična (*Stellaria media*), čestoslavica poljska (*Veronica arvensis*), proso (*Echinochloa crus-galli*), bulka (*Papaver rhoeas*).

### POTPUNA ZAŠTITA

Budite jedinstveni i sigurni u odabir herbicida za uljanu repicu. Samo visoko selektivni i provereni proizvodi pružaju potpunu zaštitu bez posledica.

# SCATTO<sup>®</sup>

## NOKAUT ZA ŠTETOČINE

**SCATTO** je nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Pripada grupi piretroida, koju odlikuje veoma brzo delovanje na ciljane organizme. Aktivna materija deltametrin, ometa sposobnost nervne ćelije u prenosu signal, što izaziva gubitak koordinacije, paralizu i veoma brzo uginuće insekata - "knock down" efekat. Na ovaj način se brzo sprečava oštećenje kultura od insekata. **SCATTO** je pogodan za upotrebu u ICM (integrirano upravljanje usevima). **SCATTO** je registrovan u EU.



### O PROIZVODU

#### Sastav

Deltametrin – 25 g/l (98% tehničke čistoće)

#### Formulacija

Koncentrat za emulziju (EC)

**OIL SEED PRO<sup>™</sup>**  
TECHNOLOGY

PAKOVANJE



1l  
200ml  
100ml

Primena	Preporučena doza/ha	Vreme primene	Štetočine
Uljana repica	0,2-0,3l /ha	Pri pojavi prvih pokretnih stadijuma	Crvenoglavi repičin buvač ( <i>Psylliodes chrysocephala</i> ) Repičina lisna osa ( <i>Athalia colibri</i> ) Repičin sjajnik ( <i>Meligethes aeneus</i> )

# GRASSER®

## ZAUSTAVITE KOROVE ZA 24 ČASA



**GRASSER** je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u usevu ULJANE REPICE. Nakon usvajanja od strane biljke aktivna materija kvizalofop-p-etyl se izuzetno brzo transportuje duž sprovodnog sistema korovske biljke i dospeva do meristemskog tkiva. Korovi prestaju sa rastom već 24 časa nakon tretmana. Prvi simptomi delovanja se uočavaju nakon 5-7 dana u vidu bledožute boje, a nakon 10 – 14 dana javlja se crvenilo lista nakon čega nastupa sušenje korovskih biljaka. Nakon tog perioda i nadzemna lisna masa i rizomi divljeg sirk-a više nisu problem.

### O PROIZVODU

#### Sastav (a.m.)

Kvizalofop-p-etyl 100 g/l

#### Formulacija

Koncentrat za suspenziju (SC)



Pravilnim odabirom dobro formulisanog proizvoda smatra se presudnim faktorom za efikasnost graminicida. **Birajte pametno formulisan proizvod.**

Primena	Preporučena doza/ha	Suzbijा	Karenca
Uljana repica	0,6 l/ha preparata uz 200-300 l/ha vode	Jednogodišnje travne korove izuzev jednogodišnje livadarke	75 dana
	1 l/ha preparata uz 200-300 l/ha vode	Za pirevinu i višegodišnje travne korove kada dostignu 15-20 cm visine	

# Sirena®

## UZBUNA ZA BOLEST, SIGURAN ODGOVOR ZA VRHUNSKI ROD

**SIRENA** je sistemični fungicid preventivnog, kurativnog i eradicativnog delovanja. Suzbijia i kontrolise širok spektar fitopatogenih gljiva, prouzrokovaca bolesti uljane repice (*Phoma lingam*, *Sclerotinia sclerotiorum*, *Alternaria brassicae*). Primeniti čim bolest počne da se razvija i ponoviti po potrebi. Napredna formulacija ovog proizvoda, omogućava mu brzo prodiranje u biljno tkivo do mesta delovanja i obezbeđuje dugotrajno i efikasno fungicidno delovanje čak i pri većim količinama padavina

### O PROIZVODU

#### Sastav (a.m.)

Metkonazol 60 g/l

#### Formulacija

Koncentrat za emulziju (EC)



Primena	Preporučena doza/ha	Vreme primene	Bolest	Karenca
Uljana repica	1,2 -1,5 l/ha preparata uz utrošak 200-400 l vode	Preventivno, pre sticanja uslova za razvoj infekcije	Trulež lista i izdanka ( <i>Phoma lingam</i> ), Belu trulež ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ), Crnu pečavost kupusnjača ( <i>Alternaria brassicae</i> )	14 dana


### PLAN PRIMENE PREPARATA U USEVU ULJANE REPICE

SCATO

RAPSAN PLUS®

GRASSER

Sirena®




# RW Stick™

Azotno đubrivo i okvašivač

Đubrivo i okvašivač u jednom proizvodu,  
na bazi prirodnih polimera

**RW Stick** je sredstvo koje se dodaje radi oplemenjivanja rastvora za prskanje sa dejstvom okvašivača i đubriva. Namenjen je za upotrebu pri prskanju na list i/ili vegetativnu površinu. RW Stick sadrži prirodne polimere koji utiču na poboljšano nanošenje rastvora, kapljice čini težim i omogućava precizniju aplikaciju i duže zadržavanje na listu ili vegetativnoj masi. U slučaju mešanja sa drugim sredstvima utiče na stabilnost rastvora. Kao đubrivo utiče na snižavanje Ph smese za prskanje, poboljšava usvajanje svih komponenti iz smese i daje efekat ozelenjavanja. Može se primeniti na svim usevima u bilo kom delu vegetacije a posebno kada je potrebna dodatna količina azota. RW Stick zbog svoje hemijske formulacije poseduje svojstva okvašivača i utiče na poboljšana svojstva rastvora za prskanje, bilo da se koristi sa agrohemijskim sredstvima ili đubrivima.



## UPUTSTVO ZA UPOTREBU (priprema rastvora za prskanje)

## SASTAV

USEV	DOZA PRIMENE	Garantovani sadržaj	% w/w	% W/W pri 20°C
Ratarstvo	50 ml/100 L vode	Prirodni Polimeri kao razloživi punilac		
Voćarstvo		Ukupni azot (N)	15	16,2
Povrtarstvo		Azot iz uree (N)	15	16,2

**RW Stick** je kompatibilan sa svim vrstama folijarnih đubriva; može se koristiti u mešavini sa uobičajenim agrohemikalijama pod uslovom da se slijede upozorenja i uputstva propisana za njihovu upotrebu.

**Pažnja:** Pre upotrebe promućkati sadržaj. Proizvod je stabilan od +5°C do +35°C. Mora se čuvati na provetrenim, hladnim i suvim mestima, daleko od izvora toplote / paljenja i mora biti zaštićen od sunčeve svetlosti. U slučaju nenamernog izlivanja, kupujte odgovarajućim upijajućim materijalima i sakupljajte ih mehanički u odgovarajuće posude za pravilno odlaganje. Rok trajanja 5 godina od datuma proizvodnje.

Proizvođač garantuje da je ovaj proizvod u skladu sa hemijskim opisom na etiketi i u originalnom pakovanju. Preporučene doze su okvirne; za tačne količine obratite se predstavniku prodaje. Nije dozvoljena prodaja u rasutom stanju. Nakon upotrebe ambalažu adekvatno odložiti.





Od 1876.

### RWA Srbija d.o.o.

Bulevar Zorana Đindjića 67/17,  
11070 Novi Beograd, Srbija  
Tel.: +381 11 212 30 35  
Fax: +381 11 212 30 36  
[www.rwa.co.rs](http://www.rwa.co.rs)

rwasrbija RWA SRBIJA

### PJ Rumenka

Kisački put 3  
21201 Rumenka, Srbija  
Tel.: +381 21 300 04 71  
Fax: +381 21 300 04 70

## Prodajni tim RWA Srbija d.o.o.

