



RWA

Vrednosti nas spajaju

Katalog pesticida

Proleće 2022.

Herbicidi



Fungicidi



Insekticidi



Folijarni program



rwa.co.rs



Poštovane kolege i prijatelji,


Do sada ste već mogli da upoznate kompaniju RWA koja u Srbiji posluje u oblasti distribucije, trgovine i ekskluzivnog zastupništva svetski poznatih kompanija iz različitih oblasti agrara. Pored saradnje sa drugim kompanijama radimo i na razvoju sopstevnih brendova i paleta proizvoda.

Pre 5 godina započeli smo razvoj departmana za sredstva za zaštitu bilja, gde smo dokazali da smo Vaš pouzdan partner, kao i do sada u svim ostalim oblastima. Naš najvažniji cilj u prodaji i distribuciji sredstava za zaštitu bilja je očuvanje i jačanje sadašnjih pozicija, kao i stvaranje novih, čvrstih partnerskih veza sa našim saradnicima.

Preparati iz naše distribucije Vam nude pouzdanost i stabilnost u primeni, što je preduslov za kvalitetnu proizvodnju.

Naša obaveza je da Vam budemo servis i podrška u primeni znanja i tehnologija, gde će Vam naš tim u svakom momentu i na svakom mestu biti na raspolaganju.

Vrednosti nas spajaju!





ZAŠTITA BILJA

Provereni preparati
za pouzdanu zaštitu useva

Sadržaj kataloga broj
stranice

HERBICIDI 6-16

FUNGICIDI 18-19

INSEKTICIDI 20-22

FOLIJARNI PROGRAM 23-27



Katalog je savetodavnog karaktera.

Pri korišćenju preparata, obavezno pročitati
uputstvo za upotrebu!



Vrednosti nas spajaju

www.rwa.co.rs



RWA otvorio logistički centar u Rumenci

- Završena je prva faza izgradnje objekta u Rumenci. Ona obuhvata silos čelije kapaciteta 14.000 m³ i podna skladišta kapaciteta 11.000 m³
- U narednom periodu najavljene su još tri faze investicija, a planirano je da čitav kompleks bude završen do 2026. godine
- Austrijski ambasador u Republici Srbiji: RWA u Srbiji posluje duže od jedne decenije i drago mi je što jedna takva kompanija, iz godine u godinu, unapređuje svoje poslovanje





Rumenka, 29. oktobar 2021. godine

Jedna od najstarijih zadruga na svetu iz Austrije Raiffeisen Ware Austria (RWA), prisutna u Srbiji pod nazivom RWA Srbija, nastavila je sa investiranjem u srpsku privredu i svečano je otvorila kompleks objekata za skladištenje žitarica u Rumenci. U pitanju je jedan od najvećih logističkih centara tog tipa u Republici Srbiji, a ukupna vrednost investicije će iznositi više od 13 miliona evra.

Dušan Mezulić, direktor RWA u Srbiji, ističe da je završena tek prva faza investicija, a da se očekuje da će ceo logistički centar biti gotov do 2026. godine.

„U prvoj fazi završene su silos čelije površine 14.000 m³ i podna skladišta kapaciteta 11.000 m³, a u narednom periodu nas očekuje izgradnja centra za doradu i pakovanje semena strnih žita i soje, 16 dodatnih silos čelija, dva podna skladišta, sušare i vagarske kućice što će omogućiti nova radna mesta i još veću saradnju sa poljoprivrednim proizvođačima. Verujem da ćemo ostvariti odličnu saradnju sa lokalnim privrednicima i poljoprivrednicima i da ćemo zajedno doprineti razvoju poljoprivrede u Republici Srbiji i jačanju saradnje srpske i austrijske privrede“, objašnjava Mezulić.

Mezulić dodaje da je Rumenka strateški važna pozicija za razvoj srpske poljoprivrede: „Zbog blizine luke u Novom Sadu, blizine autoputu, kanalu Dunav-Tisa-Dunav i blizine poljoprivrednim proizvođačima, Rumenka je jedno od najvažnijih mesta za razvoj poljoprivrede u Republici Srbiji. Drago nam je što ćemo upravo tu imati najsavremenije postrojenje za skladištenje i doradu strnih žita i soje“.

Svečanom otvaranju kompleksa objekata za skladištenje žitarica prisustvovali su Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade, Karin Traunmiller, zamenica ambasadora Austrije u Republici Srbiji, Mihael Dobersberger, trgovinski ataše u Ambasadi Austrije i lokalni poljoprivrednici i kooperanti.

Ambasador Austrije u Srbiji, Nikolaus Luteroti, napomenuo je da su ovakve investicije značajne za jačanje veza dveju država: „Srbija i Austrija imaju odličnu višegodišnju saradnju na svim nivoima i sa ponosom ističemo da smo među najvećim investitorima u srpsku privredu. RWA u Srbiji posluje duže od jedne decenije i drago mi je što jedna takva kompanija, iz godine u godinu, unapređuje svoje poslovanje u Republici Srbiji. Logistički kompleks u Rumenci je jedan od najvećih centara tog tipa i sigurno će biti podstrek investicijama drugih austrijskih kompanija.“

RWA više od 10 godina posluje u Srbiji i ulaže u domaće poljoprivredne proizvode, a najviše u hibride kukuruza i uljane repice, kao i sorte soje i pšenice. Nedavno su otvorili silos u Zrenjaninu, a njihove delatnosti obuhvataju i otkup merkantilne robe, terminsko ugovaranje robe i snabdevanje poljoprivrednika reprodukcijskim materijalom. RWA je jedna od najstarijih zemljoradničkih zadruga na svetu. Formirana je u 19. veku, a i dalje je u vlasništvu svojih zadrugara.





ARION PRO

HERBICID

Primena:

Selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje širokolisnih korova u usevu kukuruza

Sastav:

Aktivna supstanca **DIKAMBA 480 g/l**

Formulacija:

Koncentrovani rastvor (SL)

Mogućnost mešanja:

Može se mešati sa preparatima na bazi bromoksinila, nikosulfurona, rimsulfurona, 2,4-D, MCPA.

Napomena:

Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu.

Karenca: Kukuruz - OVP

Pakovanje: 1/1, 500 ml

USEV	KOLIČINA PRIMENE	VREME PRIMENE
KUKURUZ	0,5 - 0,6 l/ha	Kad je kukuruz u fazi 3-5 listova, a korovi od faze kotiledona do razvijenih 2-6 listova

SPEKTAR DELOVANJA:

ambrozija pelenasta (*Ambrosia artemisifolia*),
vijušac njivski (*Bylterdikia convolvulus*),
pepeljuga (*Chenopodium album*),
pepeljuga srcolisna (*Chenopodium hybridum*),
konica obična (*Galinsoga parviflora*),
dvornik veliki (*Polygonum lapathifolium*),

SPEKTAR DELOVANJA:

pomoćnica obična (*Solanum nigrum*),
gorčika (*Sonchus spp.*),
čistac jednogodišnji (*Stachys annua*),
boca obična (*Cirsium arvense*),
poponac obični (*Convolvulus arvensis*),
broćika (*Galium aparinae*)



ATOS

HERBICID

Primena:

Selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza

Sastav:

Aktivna supstanca **NIKOSULFURON 40 g/l**

Formulacija:

Koncentrovana suspenzija (SC)

Kompatibilnost:

ATOS se može mešati sa preparatima na bazi dikambe, 2,4 D, bentazona, rimsulfurona, mezotriona.

Inkompatibilnost:

Ne sme se mešati sa organofosfornim insekticidima.

Karenca: Kukuruz - OVP

Pakovanje: 1/1, 5/1 lit.

USEV	KOLIČINA PRIMENE	VREME PRIMENE
KUKURUZ	0,75 - 1,5 l/ha	Jednokratna primena
	1,0 l/ha + 0,5 l/ha ili 0,75 l/ha + 0,75 l/ha	Dvokratna primena

VREME PRIMENE:

- Jednokratnom primenom kada usev ima razvijena 3-7 listova (fenofaze 12-17 BBCH skale), a korovi 1-3 lista za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova, odnosno tretiranjem kada su korovi visine 15-25 cm.
- Kod dvokratne primene, prvo tretiranje kada su jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi u fazi 2-4 lista, a divlji sirak tek iznikao. Drugo tretiranje, 8-10 dana nakon prvog, kada su se jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi regenerisali, a divlji sirak visine 15-25 cm.

SPEKTAR DELOVANJA:

divlji sirak (*Sorghum helepense*),
muhar sivi (*Setaria glauca*),
muhar veliki (*Echinochloa crus-galli*),
pepeljuga obična (*Chenopodium album*),
mišljakinja obična (*Stelaria media*),
pomoćnica obična (*Solanum nigrum*),
štir običan (*Amaranthus retrofl exus*),
loboda obična (*Atriplex patula*)



FUSIFOR

HERBICID

Primena:

Selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korovskih vrsta u usevima šećerne repe i suncokreta

Sastav:

Aktivna supstanca **FLUAZIFOP-P-BUTIL 125 g/l**

Formulacija:

Koncentrat za emulziju (EC)

Plodored:

Ukoliko dođe do prevremenog skidanja ili preoravanja useva na tretiranim površinama najmanje 2 meseca od primene, ne smeju se sejati strna žita i kukuruz. U normalnom plodoredu mogu se sejati svi usevi.

Karenca: Šećerna repa 70 dana; suncokret - OVP

Pakovanje: 1/1, 5/1 lit.

USEV	KOLIČINA PRIMENE	VREME PRIMENE
ŠEĆERNA REPA	1 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova	Korovi u intezivnom porastu, faza 3-5 listova
SUNCOKRET	1,5 l/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova	Do početka cvetanja kada su korovi u intezivnom porastu, faza 3-5 listova

SPEKTAR DELOVANJA:

Jednogodišnji travni korovi:
proso korovsko (*Echinochloa crus-galli*),
divlji sirak iz semena (*Sorghum halepense*),
muhar sivi (*Setaria glauca*),
muhar zeleni (*Setaria viridis*),
svračica (*Digitaria sanguinalis*)

SPEKTAR DELOVANJA:

Višegodišnji travni korovi:
divlji sirak iz rizoma (*Sorghum halepense*),
pirevina obična (*Agropyrum repens*),
zubača obična (*Cynodon dactylon*)



MIGHTY

HERBICID

Primena:

Selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza

Sastav:

Aktivna supstanca **MEZOTRION 480 g/l**

Formulacija:

Koncentrovana suspenzija (SC)

Mogućnost mešanja:

Može se mešati sa herbicidima na bazi rimsulfurona i nikosulfurona. Ne sme se mešati sa insekticidima izrazito kisele reakcije.

Karenca: Kukuruz - OVP

Pakovanje: 1/1, 250 ml

USEV	KOLIČINA PRIMENE	VREME PRIMENE
KUKURUZ	0,25 l/ha + 0,25 l/ha okvašivača RW Stick	Kad je kukuruz u fazi 2-8 listova (10-18 BBCH), a korovi od faze kotiledona do razvijenih 2-6 listova

SPEKTAR DELOVANJA:

MIGHTY + okvašivač RW Stick ili RW Stick AF dobro suzbija sledeće jednogodišnje širokolisne korove:

pepeljuga (*Chenopodium album*),
 pepeljuga srolisna (*Chenopodium hybridum*),
 lipica teofrastova (*Abutilon thophrasti*),
 štir obični (*Amaranthus retrofl exus*),
 tatula obična (*Datura stramonium*),
 dvornik ptičji (*Polygonum aviculare*),
 dvornik veliki (*Polygonum lapathifolium*),
 gorušica poljska (*Sinapis arvensis*),
 pomoćnica obična (*Solanum nigrum*),
 čistac jednogodišnji (*Stachys annua*),
 boca obična (*Xanthium strumarium*)



VITORIOMOX

HERBICID

Primena:

Selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova u soji i IMI hibridima suncokreta

Sastav:

Aktivna supstanca **IMAZAMOKS 40 g/l**

Formulacija:

Koncentrovani rastvor (SL)

Kompatibilnost: U usevu soje može se mešati sa sredstvima na bazi bentazona.

Inkompatibilnost: Ne sme se mešati sa insekticidima iz grupe organofosfata i karbamata.

Napomena: U jesen iste godine i proleće sledeće godine (ukoliko je preparat primenjen posle jula prethodne godine) može biti fitotoksičan za lucerku, grašak, pasulj i druge mahunarke, šargarepu, peršun, pastrnak, krompir, zelenu salatu.

Karenca: Suncokret – OVP; Soja – 35 dana

Pakovanje: 1/1 lit.

USEV	KOLIČINA PRIMENE	VREME PRIMENE
SOJA	1,0 – 1,2 lit/ha	Od faze 1-3 trolista soje (11-13 BBCH), a kad su korovi u fazi od kotiledona do 2-4 lista
SUNCOKRET (otporan na imidazolinone)	1,2 lit/ha	Kad je suncokret u fazi od nicanja do 3. para listova (05-15 BBCH), a kad se suzbija volovod od 2. do 3. para listova (12 – 18 BBCH), a kad su korovi u fazi od kotiledona do 2-4 lista

SPEKTAR DELOVANJA:

Širokolisni korovi:

štir obični (*Amaranthus retrofl exus*),
vijušac njivski (*Bilderdykia convolvulus*),
pepeljuga obična (*Chenopodium album*),
tatula obična (*Datura stramonium*),
volovod (*Orobancha sp.*),
dvornik obični (*Polygonum persicaria*),
gorušica poljska (*Sinapis arvensis*),

pomoćnica obična (*Solanum nigrum*),
muhar sivi (*Setaria glauca*),
boca obična (*Xanthium strumarium*),
pelenasta ambrozija (*Ambrosia artemisiifolia*)

Uskolisni korovi:

sirak (*Sorghum halepense*) iz semena



KARMA

HERBICID

Primena:

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza

Sastav:

Aktivna supstanca S METOLAHLOR 960 g/l

Formulacija:

Koncentrat za emulziju (EC)

Mogućnost mešanja:

Može se mešati sa preparatima na bazi mezotriona i terbutilazina.

Karenca: 70 dana za silažni kukuruz.

Za merkantilni kukuruz: OVP

Pakovanje: 1/1, 5/1 lit.

USEV	KOLIČINA PRIMENE	VREME PRIMENE
KUKURUZ	1,4 l/ha (14ml na 100m ²) na humoznim zemljištima 3-5% humusa)	Tretiranjem zemljišta posle setve a pre nicanja kukuruza, kada korovi još nisu nikli
	1,5 l/ha (15ml na 100m ²) nicanja kukuruza, kada korovi još nisu nikli na jako humoznim zemljištima (>5% humusa)	

SPEKTAR DELOVANJA:

Jednogodišnji uskolisni korovi:

proso korovsko (*Echinochloa crus-galli*),
crvenkasti muhar (*Setaria glauca*),
zeleni muhar (*Setaria viridis*),
sirak divlji i iz semena (*Sorghum halepense*)

Jednogodišnji širokolisni korovi:

štir obični (*Amaranthus retrofl exus*),
pepeljuga obična (*Chenopodium album*)

Ne treba ga primjenjivati na slabo humoznom zemljištu (<1% humusa) i zemljištima čija je pH <5,5. Ukoliko dođe do prevremenog skidanja ili preoravanja useva na tretiranim površinama se može sejati samo kukuruz, bez dodatnog tretiranja herbicidima. Posle 4-5 meseci na tretiranim površinama se mogu sejati strna žita.



PANTENON

HERBICID

Primena:

Selektivni herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i pojedinih višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza

Sastav:

Aktivna supstanca **BENTAZON u obliku Na soli 480 g/l**

Formulacija:

Koncentrovani rastvor (SL)

MEŠANJE SA DRUGIM SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA

Kompatibilnost: Može se mešati sa preparatima na bazi dikambe, nikosulfurona, rimsulfurona.

Inkompatibilnost: Ne sme se mešati sa fluazifop-b butilom preparatima na bazi organofosfornih insekticida, a mogućnost mešanja sa drugim preparatima treba prethodno ispitati na manjoj površini.

Pakovanje: 1/1, 5/1, 20/1 lit.

USEV	KOLIČINA PRIMENE	VREME PRIMENE
KUKURUZ	3,0 - 4,0 l/ha	Kukuruz u fazi 1-5 listova (faza 11-15 BBCH skale) a korovi u fazi 2 do 6 listova

SPEKTAR DELOVANJA:

Vrste korova koje suzbija u količini primene od 3-4 l/ha preparata (odnosno 30-40ml na 100m²):

- Dobro suzbija:
 - štir obični (*Amaranthus retrofl exus*),
 - pepeljuga (*Chenopodium album*),
 - pomoćnica obična (*Solanum nigrum*),
 - lipica teofrastova (*Abutilon theophrasti*),
 - tatula obična (*Datura stramonium*)
- Zadovoljavajuće suzbija:
 - vijušac njivski (*Bilderdykia convolvulus*),
 - suncokret (*Helianthus annuus*),
 - boca obična (*Xanthium strumarium*)

Maksimalni broj tretiranja na istoj površini u jednoj godini: Jednom!



DANCOR 70 WG

HERBICID

Proizvođač: UPL Europe Ltd | Distributer: RWA Srbija doo

Primena:

Sistemični hrebicid selektivnog delovanja, primenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u krompiru, soji i paradajzu

Sastav:

Aktivna supstanca **METRIBUZIN 700 g/kg**

Formulacija:

Vododisperzibilne granule (WG)

Mogućnost mešanja:

U usevu krompira, posle setve, a pre nicanja, može se mešati sa preparatima na bazi metolahlora, pedimentalina. U usevu soje, može se mešati sa preparatima na bazi metolahlora i dimetenamida.

Karenca: 42 dana krompir i paradajz; soja - OVP

Pakovanje: 1/1, 25/1 kg

USEV	KOLIČINA PRIMENE	VREME PRIMENE
SOJA	0,5 kg/ha (na zemljištima sa 3-5 % humusa) 1 kg/ha (na zemljištima >5% humusa)	Posle setve, a pre nicanja useva
KROMPIR	0,75 kg/ha (na zemljištima sa 1,5-3% humusa) 1 kg/ha (na zemljištima sa 3-5% humusa) 1,5 kg/ha (na zemljištima >5% humusa)	Posle sadnje, a pre nicanja useva
	0,5 kg/ha (na zemljištima sa 1,5-3% humusa) 0,75 kg/ha (na zemljištima >5% humusa)	Posle nicanja useva, kada krompir ima razvijenih 5- 8 listova (faza 15 (105) - 18 (108) BBCH skale)
PARADAJZ	0,5 kg/ha (na zemljištima sa 3-5% humusa) 0,75 kg/ha (na zemljištima >5% humusa)	8-10 dana nakon rasađivanja

SPEKTAR DELOVANJA:

Jednogodišnji širokolisni korovi: teofrastova lipica (*Abutilon theophrasti*), štirevi (*Amaranthus spp.*), ambrozija pelenasta (*Ambrosia artemisifolia*), repica crna (*Brassica nigra*), hoću-neću (*Capsella bursa-pastoris*), pepeljuga (*Chenopodium spp.*), lubeničarka njivska (*Hibiscus trio-num*), dvornici (*Polygonum spp.*), tušt obični (*Portulaca oleracea*), rotkva divlja (*Raphanus raphanistrum*), gorušica poljska (*Sinapis arvense*), čistac jednogodišnji (*Stachys annua*), loboda obična (*Atriplex patula*), konica obična (*Galinsoga parviflora*), posunac običan (*Heliottropium europium*), tatula obična (*Datura stramonium*)



TEMSA[®]

SIGURNOST ZA PROFESIONALNE PROIZVOĐAČE

TEMSA je herbicid koji suzbija širokolisne korove u kukuruzu i ima veliku fleksibilnost primene i obezbeđuje sigurnost i stabilnost u proizvodnji kukuruza. Aktivna materija mezotrion svojim multi sight efektom delovanja (folijarno i preko zemljišta) pruža odličnu efikasnost u suzbijanju najinvazivnijih širokolisnih korova u kukuruzu kao što su *Ambrozija*, *Abuthilon*, *Datura*, *Xhathium*.

O PROIZVODU

Sastav (a.m)

Mezotrion 100 g/l

Formulacija

Koncentrat za suspenziju (SC)



Efikasan herbicid obezbeđuje **sigurnost i stabilnost u proizvodnji kukuruza**

Kultura	Preporučena doza/ha	Vreme primene	Karenca
Kukuruz	1-1.2 l	u fazi od 2-8 lista kukuruza	OVP

U uslovima velike zakorovljenosti, koristiti dozu od 1,5 l/ha.


DOZIRANJE PO CELOJ POVRŠINI

Radi proširenja spektra delovanja na uskolisne korove idealno se kombinuje sa proizvodom Motivell extra 6 OD.

Primenom proverene i u praksi dokazane aktivne materije uz SMART sistem, dobijamo veliku fleksibilnost primene i obezbeđujemo sigurnost i stabilnost u proizvodnji kukuruza.

Temsa u sebi pored aktivne materije sadrži i SMART sistem prilagodljivih adjuvanata i koformulanata koji dodatno doprinose povećanju efikasnosti i herbicid ne zahteva dodavanje okvašivača.

Selektivnost • Mobilnost • Aktivacija • Racionalnost • Termostabilnost



S Selektivnost
M Mobilnost
A Aktivacija
R Racionalnost
T Termostabilnost

selektivnost (sprečavanje neželjenih efekata po kukuruz)
sistemično kretanje kroz korovsku biljku, od korena do vrha
aktivacija svega 15 min. nakon primene
racionalno korišćenje aktivne materije 75 -100 gr/ha
jednaka efikasnost u svim vremenskim uslovima



GRASSER®

ZAUSTAVITE KOROVE ZA 24 ČASA

GRASSER je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u usevima soje, suncokreta, uljane repice, šećerne repe i krompira. Nakon usvajanja od strane biljke aktivna materija kvizalofop-p-etil se izuzetno brzo transportuje duž sprovodnih sistema i dospeva do meristemskog tkiva. Korovi prestaju sa rastom već 24 časa nakon tretmana. Prvi simptomi delovanja se uočavaju nakon 5-7 dana u vidu bleđožute boje, a nakon 10 – 14 dana javlja se crvenilo lista nakon čega nastupa sušenje korovskih biljaka. Nakon tog perioda i nadzemna lisna masa i rizomi divljeg sirka više nisu problem.

O PROIZVODU

Sastav (a.m)

Kvizalofop-p-etil 100 g/l

Formulacija

Koncentrat za suspenziju (SC)



PAKOVANJE



Efikasan herbicid u **zaštiti od korova u soji, suncokretu, šećernoj repi i krompiru**

Kultura	Preporučena doza/ha ¹	Vreme primene	Karenca
Soja, suncokret, uljana repica, šećerna repa i krompir	jednogodišnji uskolisni korovi 0.5 - 1 l/ha	korovi u fazi razvoja 3-6 listova, visina korova 30- 60 cm	OVP
	višegodišnji uskolisni korovi, divlji sirak iz rizoma 1 - 1,5 l/ha		
	zubača i pirevina 1.5 - 2 l/ha		

sirak u soji



Pravilnim odabirom dobro formulisanog proizvoda smatra se presudnim faktorom za efikasnost graminicida. Birajte pametno formulisan proizvod.



RAPSAN PLUS[®]

BUDITE UVEK U PLUSU

RAPSAN PLUS[®] je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u uljanoj repici.

Snazan herbicid koji u sebi sadrži dve aktivne materije. Na taj način postizemo potpunu zaštitu od korova.

Rapsan plus se može primenjivati **posle setve, a pre nicanja uljane repice, kao i u ranom postu do faze trećeg lista.**

O PROIZVODU

Sastav (a.m)

Metazahlor 333 g/l + Kvinmerak 83 g/l

Formulacija

Koncentrat za suspenziju (SC)

PAKOVANJE



1L
5L



Efikasan herbicid obezbeđuje **sigurnost i stabilnost u proizvodnji uljane repice**

Kultura	Preporučena doza/ha	Vreme primene	Karenca
Uljana repica	2 – 2,25 l	Posle setve, a pre nicanja (pre em.) ili nakon nicanja useva (post em.) do faze 3 lista	OVP

BEZBEDAN PROIZVOD ZA VAŠ USEV

Ciljani korovi: (*Capsella bursa-pastoris*), pepeljuga (*Chenopodium album*), bročika lepuša (*Galium aparine*), gorčika rapava (*Sonchus asper*), mlečika rana (*Euphorbia helioscopia*), gorušica poljska (*Sinapis arvensis*), gorčika obična (*Sonchus oleraceus*), mišjakinja obična (*Stellaria media*), čestoslavica poljska (*Veronica arvensis*), proso (*Echinochloa crus-galli*), bulka (*Papaver rhoes*).

Budite jedinstveni i sigurni u odabir herbicida za uljanu repicu.

Samo visoko selektivni i provereni proizvodi pružaju potpunu zaštitu bez posledica.



RWA distributer za BiH



Dejtonska 105, 76100 Brčko

Tel/fax: 054/643-033, 643-156

Email: bozicdoo@gmail.com

Firma Božić d.o.o. osnovana je 1996. godine sa sedištem u Brčkom. U početku firma se bavila uvozom i prodajom žitarica, da bi kako je rasla proširila svoj portfolio na uvoz-izvoz, transport i distribuciju semena, mineralnih đubriva, stočne hrane, pesticida i drugih proizvoda u poljoprivredi. Trenutno firma Božić d.o.o., sa svojim poslovnim

jedinicama koje se nalaze na području Republike Srpske i Federacije BiH, zapošljava oko 45 radnika, od toga 8 inženjera poljoprivrede.

Od 2017. godine generalni smo zastupnici RWA proizvoda za BiH. Već u prvoj sezoni prepoznat je veliki potencijal RWA

semena i pesticida na BiH tržištu, što se potvrdilo i u narednim sezonama. Zbog optimalnog odnosa cene i kvaliteta prodaja je 2018. porasla za preko 200%, a trend porasta prodaje se nastavio i u narednim godinama.

Zajedničkim delovanjem, pojačanim marketingom, prisustvom stručnih ljudi na terenu kao i održavanjem edukativnih predavanja, očekujemo da i naredne sezone povećamo prisustvo RWA proizvoda na tržištu BiH.

Naši doprinosi kroz zastupanje RWA proizvoda ogledaju se u konstantnom ulaganju u marketing, obuke, resurse i radnu snagu. Cilj nam je uskladiti poslovanje sa zahtevima korisnika, koji su nam primarni orijentir, ali i da poslovanje bude praćeno zakonskom regulativom, te standardima kvaliteta i bezbednosti.

DIFURE[®]

POWERED BY
FAXER[®] GOLD



Sastav (a.m)
DIFCOR 250 EC Difenokonazol 250 g/l
Formulacija
Koncentrat za emulziju (EC)

Sastav (a.m)
FAXER 450 EC Prohloraz 450 g/l
Formulacija
Koncentrovana suspenzija (SC)

DIFURE GOLD fungicid koji u sebi sadrži dve aktivne materije i pruža dvostruku odbranu od pegavosti lista šećerne repe odlične je sinergističke aktivnosti. Sistemichnog i kurativnog delovanja, sastavni je element strategije u zaštiti šećerne repe u svetu.

Jer šećer se čuva na njivi!



PAKOVANJE
750 ml
+
1 l

Fungicid koji pruža spektar delovanja na najznačajnije bolesti šećerne repe i strnih žita

Prohloraz je aktivna materija koja predstavlja zlatni standard u antirezistentnoj strategiji u suzbijanju širokog spektra bolesti u strnim žitima i šećernoj repi.

Difenokonazol pruža lokal sistemichno i kurativno delovanje, prodire unutar struktura lista, zaustavlja postojeću i sprečava razvoj nove infekcije.

Ogledi koji su rađeni širom Evrope, a i kod nas su ponovo potvrdili da kombinacija aktivnih materija fungicida Difure[®] Gold pruža spektar delovanja na najznačajnije bolesti šećerne repe kao što su siva pegavost lišća *Cercospora beticola*, mrka pegavost *Ramularia*, pepelnica *Erysiphe spp.*


PRIMENA

U prvim tretmanima zaštite lisne mase šećerne repe. Najbolje ga je primeniti neposredno pre pojave simptoma pegavosti ili u situacijama kada je inokulum prisutan, a uslovi vlažnosti i temperature vazduha povoljni za razvoj patogena. Moguće je mešanje sa proizvodima koji u sebe sadrže aktivne materije kontaktnog načina delovanja.

Doza primene: pakovanje prilagođeno površini od 2 ha
Preporučena količina vode prilikom aplikacije: 200-300 l/ha

KARENCA

21 dan





Uzbuna za bolest, siguran odgovor za vrhunski rod

SIRENA® je sistemski fungicid preventivnog, kurativnog i eradikativnog delovanja. Suzbija i kontroliše širok spektar fitopatogenih gljiva - prouzrokovaca bolesti žitarica (*Blumeria graminis*, *Puccinia spp.*, *Septoria spp.*, *Pyrenophora teres*, *Rhynchosporium secalis*), kao i bolesti uljane repice (*Alternaria brassicae*, *Phoma lingam*, *Sclerotinia sclerotiorum*). Za razliku od ostalih fungicida iz grupe triazola ističe se po specifičnosti delovanja na palež klasa pšenice (*Fusarium spp.*). Napredna formulacija ovog proizvoda, omogućava mu brzo prodiranje u biljno tkivo do mesta delovanja i obezbeđuje dugotrajno i efikasno fungicidno delovanje čak i pri većim količinama padavina.

O PROIZVODU

Sastav (a.m.)

Metkonazol 60g/l

Formulacija

Koncentrat za emulziju (EC)

PAKOVANJE



1l
5l

KARENCA

21 dan za žitarice, 14 dana za uljanu repicu

PRIMENA

Radi održavanja useva u kondiciji i očuvanja što više lisne mase, preparat SIRENA primeniti pre svega preventivno, pre sticanja, odnosno tokom sticanja uslova za širenje infekcije. Preporučena količina vode je 200-300 l/ha.

Doza primene u pšenici, ječmu i uljanoj repici: 1.2-1.5 l/ha

Ocena efikasnosti metkonazola na različite bolesti strnih žita

	Ozima pšenica	Ozimi ječam	Jari ječam	Tritikale	Raž
Siva pegavost (<i>Septoria tritici</i>)	C			C	
Žuta prugasta rđa (<i>Puccinia striiformis</i>)	C	C	C	C	C
Crna rđa (<i>Puccinia graminis</i>)	C	C	C	C	C
Sočivasta pegavost ječma (<i>Rhynchosporium secalis</i>)		R	R		R
Mrežasta pegavost ječma (<i>Pyrenophora teres</i>)		R	R		
Pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>)	MC	MC	MC	MC	MC
Palež klasa (<i>Fusarium spp.</i>)	GR			GR	

C = Potpuna kontrola
MC = Umerena kontrola

R = Smanjenje infekcije
GR = Znatno smanjenje infekcije



TALON

INSEKTICID

Primena:

**Nesistemični insekticid i akaricid
sa kontaktnim i digestivnim delovanjem**

Sastav:

Aktivna supstanca **DELTAMETRIN 25 g/l**

Formulacija:

Koncentrat za emulziju (EC)

TALON je nesistemični insekticid i akaricid, sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Koristi se u zasadima VINOVE LOZE, za suzbijanje prve ili druge generacije sivog grozdovog smotavca (*Lobesia botrana*).

USEV	KOLIČINA PRIMENE	VREME PRIMENE
VINOVA LOZA	u koncentraciji 0,03-0,04% (3-4ml u 10l vode) za suzbijanje prve generacije	10-14 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira feromonskim klopama ili na početku piljenja gusenica
	u koncentraciji 0,05-0,07% (5-7ml u 10l vode) za suzbijanje druge generacije	

Mogućnost mešanja sredstva (kompatibilnost):

Može se mešati sa: primikarbom, hlörpirifos – metilom.

Nemogućnost mešanja sredstva (inkompatibilnost):

Ne sme se mešati sa: preparatima na bazi sumpora, bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije.

Karenca: Vinova loza - 21 dan

Pakovanje: 1/1, 250 ml, 100 ml



HARFA

INSEKTICID

Primena:

**Nesistemični insekticid i akaricid
sa kontaktim i digestivnim delovanjem**

Sastav:

Aktivna supstanca LAMBDA-CIHALOTRIN 25 g/l

Formulacija:

Koncentrat za emulziju (EC)

**HARFA je namenjena za
suzbijanje Žitne pijavice
(*Lema melanopus*)
pri pojavi larvi
III stupnja razvoja.**

USEV	KOLIČINA PRIMENE	VREME PRIMENE
PŠENICA	0,2 l/ha	U vreme pojave larvi III stupnja razvoja (<i>Lema Melanopus</i>)

Mogućnost mešanja sredstva (kompatibilnost):

Ne sme se mešati sa: bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije.

Maksimalan broj tretiranja:

Dva puta u razmaku 15-21 dan u toku godine na istoj površini.

Karenca: Pšenica - 35 dana

Pakovanje: 1/1, 250 ml, 100 ml



SCATTO®

JEDNIM KLIKOM SUZBIJTE ŠTETNE INSEKTE

Scatto® je nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Pripada grupi piretroida, koju odlikuje veoma brzo delovanje na ciljane organizme. Aktivna materija deltametrin, ometa sposobnost nervnih ćelija u prenosu signala za otvaranje natrijum kanala, kod insekata izaziva gubitak koordinacije i veoma brzo uginuće – “knock down” efekat. Ovim brzo sprečavamo oštećenja od insekata. Scatto je pogodan za upotrebu u ICM (integrirano upravljanje usevima).

Scatto® je registrovan u EU.

O PROIZVODU

Sastav (a.m)

Deltametrin – 25 g/l (98% tehničke čistoće)

Formulacija

Koncentrat za emulziju (EC)



PRIMENA

Scatto® se koristi za suzbijanje biljnih vaši u usevima: pasulja, zelene salate, spanaća, graška.

Kod krompira za suzbijanje krompirove zlatice (*Leptinotarsa decemlineata*) primenjuje se u količini od 0,3 l/ha.

Takođe može da se koristi u zasadima šume za suzbijanje: gubara, zelenog hrastovog savijača, ose hrastovog lišća, tretiranjem sa zemlje u količini od 0,4 l/ha uz dodatak 10 l/ha nafte (D1), iz vazduhoplova u količini od 0,2 l/ha uz dodatak 3 l/ha nafte (D1).

Usev/zasad	Štetočine	Količina / % primene	Vreme primene	Utrošak vode	Maksimalni broj tretmana
Jabuka	Jabukin smotavac (<i>Cydia pomonella</i>), Biljne vaši (<i>Aphididae</i>), jabukine lisne ose (<i>Hoplocampa testudinea</i>), Miner okruglih mina (<i>Leucoptera scitella</i>), Miner belih mina (<i>Lithocolletis corylifoliella</i>), Miner tačkastih, mramornih mina (<i>Lithocolletis blancardella</i>) 0,02-0,03 % (2-3 ml u 10 l vode)	0,03 – 0,05 % (3-5 ml u 10 l vode)	Po pojavi prvih pokretnih stadijuma štetnog organizma	600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m ²)	2 puta u razmaku od 14 dana
Strna žita*	Žitna pijavica (<i>Lema melanopus</i>) Biljne vaši (<i>Aphididae</i>)	0,2-0,3 l/ha	Pri pojavi prvih pokretnih stadijuma štetnog organizma	200-400 l/ha	Jedan tretman
Kukuruz*	Kukuruzni plamenac (<i>Ostrinia nubilalis</i>)	0,4-0,5 l/ha	Pri pojavi prvih pokretnih stadijuma	200-400 l/ha	3 puta sa razmakom od 14 dana
Uljana repica*	Repičin sjajnik (<i>Meligethes aeneus</i>), Rapičina lisna osa (<i>Athalia colibri</i>)	0,2-0,3 l/ha	Pri pojavi prvih pokretnih stadijuma	200-400 l/ha	Jedan tretman



RW AMINO™

Tečno đubrivo sa aminokiselinama

Proizvod je dobijen hemijskom hidrolizom kako bi se dobila smeša slobodnih aminokiselina i peptide tehničke čistoće koja omogućava folijarnu primenu kao i primenu sistemima za navodnjavanje. **RW Amino** je smeša aminokiselina i peptida u čijem sastavu dominiraju dve esencijalne aminokiseline Glicin i Prolin a koje imaju višestruku ulogu u metabolizmu biljaka.

UPOTREBA: **RW Amino** se preporučuje za upotrebu u svim fazama vegetativnog ciklusa kada su usevima potrebne odmah dostupne hranljive materije. Slobodne aminokiseline se brzo apsorbuju u listovima i odmah koriste u biohemijskim procesima, štedeći biljkama značajne količine energije, primena aminokiselina izaziva revitalizaciju, uz mogućnost transporta drugih molekula u smeši. Primenom preparata **RW Amino** moguće je dobiti povećanje u metabolizmu rasta biljaka (prevazilaženje perioda zaustavljenog porasta), pravilniji razvoj i veće prinose kao i mogućnost povećanja sadržaja proteina u zrnu žitarica i sadžaj ulja kod uljanih kultura.

SASTAV			Usev	Količina primene	Količina i vreme primene
Garantovani sadržaj	% w/w	% w/v	Pšenica	1-3 l/ha Ukoliko se biljke tretiraju nakon stresnih uslova (suša, oštećenja od grada, napada bolesti i insekata i slično, koristiti maksimalne doze)	1-2 aplikacije tokom faze intenzivnog porasta zajedno sa sredstvima za zaštitu bilja
Organski (N) azot, rastvorljiv	5,9	7,1	Kukuruz, soja		1-2 aplikacije od faze treće troliske kod soje ili 4 lista kukuruza zajedno sa sredstvima za zaštitu bilja
Organska materija (O.M.)	40	48,4	Uljana repica, suncokret		1-2 aplikacije zajedno sa sredstvima za zaštitu bilja
Amino kiseline (AA), ukupne	36,9	44,6	Povrće, voće		Ponoviti aplikacije po potrebi u prvim fazama rasta i razvoja
Amino kiseline (AA), slobodne	7,6	9,2			
Gustina 1210 g/L • pH 6-7 • Stanje: TEČNO					
Primena: folijarno ili sistemima kap po kap					

NAPOMENA: **RW Amino** se može koristiti u redovnoj primeni sa drugim folijarnim đubrivima. Može se mešati u redovnoj primeni sa sredstvima za zaštitu bilja.

Pakovanje: 1/1, (kutija: 12 × 1 L)



RW STICK

Đubrivo i okvašivač u jednom proizvodu, na bazi prirodnih polimera

RW Stick je sredstvo koje se dodaje radi oplemenjivanja rastvora za prskanje sa dejstvom okvašivača i đubriva. Namenjen je za upotrebu pri prskanju na list i/ili vegetativnu površinu. RW Stick sadrži prirodne polimere koji utiču na poboljšano nanošenje rastvora, kapljice čini težim i omogućava precizniju aplikaciju i duže zadržavanje na listu ili vegetativnoj masi. U slučaju mešanja sa drugim sredstvima utiče na stabilnost rastvora.

Kao đubrivo utiče na snižavanje Ph smese za prskanje, poboljšava usvajanje svih komponenti iz smese i daje efekat ozelenjavanja. Može se primeniti na svim usevima u bilo kom delu vegetacije a posebno kada je potrebna dodatna količina azota. **RW Stick** zbog svoje hemijske formulacije poseduje svojstva okvašivača i utiče na poboljšana svojstva rastvora za prskanje, bilo da se koristi sa agrohemijskim sredstvima ili đubrivima.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU (priprema rastvora za prskanje)

USEV	KOLIČINA PRIMENE	USEV		
RATARSTVO	100 ml / 100 L vode	Garantovani sadržaj	% w/w	% w/w pri 20°C
VOĆARSTVO		Ukupni azot (N)	15	16,2
POVRTARSTVO		Azot iz uree (N)	15	16,2

RW Stick AF je kompatibilan sa svim vrstama folijarnih đubriva. Može se koristiti u mešavini sa uobičajenim agro hemikalijama pod uslovom da se slede upozorenja i uputstva propisana za njihovu upotrebu.

Pakovanje: 1/1, 250 ml



RW STICK AF

Tečno azotno đubrivo sa antipenušavim svojstvima

RW Stick AF je tečno azotno đubrivo koje se dodaje radi oplemenjivanja rastvora za prskanje sa antipenušavim svojstvima. Namenjen je za upotrebu pri prskanju na list i/ili vegetativnu površinu. **RW Stick AF** sadrži polimere koji utiču na poboljšano nanošenje rastvora, omogućava precizniju aplikaciju i duže zadržavanje na tretiranim površinama, uklanja penu u rastvorima u koje se dodaje.

U slučaju mešanja sa drugim sredstvima utiče na stabilnost rastvora i sprečava pojavu pene. Kao đubrivo utiče na snižavanje Ph smese za prskanje, poboljšava usvajanje svih komponenti iz smese i daje efekat ozelenjavanja. Može se primeniti na svim usevima u bilo kom delu vegetacije a posebno kada je potrebna dodatna količina azota. **RW Stick AF** zbog svoje hemijske formulacije poseduje utiče na poboljšana svojstva rastvora za prskanje, bilo da se koristi sa agrohemijским sredstvima ili drugim đubrivima.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU (priprema rastvora za prskanje)

USEV	KOLIČINA PRIMENE	USEV		
RATARSTVO	100 ml / 100 L vode	Garantovani sadržaj	% w/w	% w/w pri 20°C
VOĆARSTVO		Ukupni azot (N)	15	16,2
POVRTARSTVO		Azot iz uree (N)	15	16,2

RW Stick AF je kompatibilan sa svim vrstama folijarnih đubriva. Može se koristiti u mešavini sa uobičajenim agro hemikalijama pod uslovom da se slede uputstva propisana za njihovu upotrebu.

Pakovanje: 1/1 (kutija: 12 × 1 L)



RW N300™

Tečno folijarno đubrivo; 100% tečni azot

RW N300™ je tečno koncentrovano azotno đubrivo sa prisustvom azota u tri oblika – nitratni, ureični i amonijačni. Odnos azota je izbalansiran tako da je preparat pogodan za folijarnu ishranu svih useva u fazama intenzivnog porasta a posebno onih sa izraženom vegetativnom masom.

PRIMENA: RW N300™, sa balansiranim sadržajem i istovremenim prisustvom sva tri oblika azota, je đubrivo koje je lako dostupno i ima produženo oslobađanje. Nitratni azot stimulise vegetativni rast u kraćem periodu, dok su druga dva oblika dostupna sa produženim dejstvom. Ovaj proizvod odmah oslobađa azot, ali takođe i postepeno u bilo kom delu biljke gde se vrši fotosinteza (lišće, stablo, nedozreo plod). Lako se postiže vizuelni efekat, posebno kod iljaka gde je već nastupio nedostatak azota. RW N300™ stimulise intenzivnu zelenu boju u tkivima. Ponovljene aplikacije donose poboljšanje efekata.

SASTAV			Usev	Količina primene	Količina i vreme primene
Garantovani sadržaj	% w/w	% w/v	Pšenica; Stočni ječam	3-5 l/ha Ukoliko se biljke tretiraju nakon stresnih uslova	Ponoviti aplikaciju u intervalu od 15-20 dana tokom vegetativnog razvoja i u prvim periodima nalivanja zrna ili ploda.
Ukupni azot (N)	30	39	Kukuruz; Soja		
Nitratni azot	7,5	9,75	Uljana repica; Suncokret		
Amonijačni azot	7,5	9,75	Povrće i industrijsko bilje	Folijarno 3-5 l/ha ili preko zemljišta	
Ureični azot	15	19,5			

RW N300™ se uspešno koristi u kombinaciji sa organskim proizvodima kao što je **RW Amino** koji poboljšavaju sposobnost zadržavanja azota na površini lista i poboljšavaju usvajanje. Mešanje sa **RW Amino** značajno povećava postojanost i u zemljišnoj primeni. Primena preparata u pivskom ječmu nije preporučljiva.

Pakovanje: 1/1 (kutija: 12 × 1 L) ; 5/1 (kutija: 2 × 5 L) ; 20/1



RW SULFO™

Tečno đubrivo sa visokim sadržajem sumpora i azota

Efikasan izvor sumpora i azota. Biljke koje iskazuju veću potrebu za sumporom su uljana repica, travnjaci, žitarice, šećerna repa, kupus i luk. Sumpor podstiče rast kvržica kod mahunarki. **RW Sulfo** je posebno pogodan za prihranu uljane repice pred cvetanje za poboljšanu oplodnju i sadržaj ulja u zrnju, a kod žitarica za mlinske karakteristike. Prihrana sa **RW Sulfo** u ranoj fazi klasanja povećava sadržaj proteina i sedimentaciju, a time i kvalitet prinosa.

RW Sulfo je tečno đubrivo koje se koristi kao dodatni izvor sumpora i azota koji biljke brzo usvajaju. Azot i sumpor su elementi koji predstavljaju važne komponente u sastavu proteina. Nedostatak sumpora može uticati na sposobnost biljke da koristi azot za sintezu proteina. U poređenju sa drugim oblicima sumpora, **RW Sulfo** je permanentno dostupan u dužem vremenskom periodu (postepeno se otpušta). Može se koristiti na većini useva, ali se posebno preporučuje za ratarske useve sa industrijskom upotrebom, kao što su uljana repica, pšenica i suncokret, kao i za većinu biljaka iz familije *Cucurbitaceae*.

SASTAV			Usev	Količina primene	Količina i vreme primene
Garantovani sadržaj	% w/w	% w/v	Uljana repica	4-6 l/ha	1-3 primene do faze cvetanja
Ukupni azot (N)	15	19,9	Suncokret		1-4 aplikacije tokom faze intenzivnog porasta
Amonijačni azot	11	14,6	Soja; Pšenica		
Ureični azot	4	5,3	Luk; Duvan		
Sumpor trioksid (SO₃), rastvorljiv u vodi	60	79,8			Kod pšenice zaključno sa fazom klasanja
Gustina 1330 g/L • pH 6-7 • Stanje: TEČNO •					
Primena: folijarno ili sistemima kap po kap					

Efikasnost RW Sulfo se povećava kada se koristi u mešavini sa proizvodima koji sadrže aminokiseline (npr RW Amino).

Pakovanje: 1/1, (kutija: 16 × 1 L) ; 5/1, (kutija: 2 × 5 L) ; 20/1

Prodajni tim

RWA Srbija d.o.o.



Goran Medić
Direktor prodaje
+381 64 64 67 779
goran.medic@raiffeisen-agro.rs



Dejan Lepki
Menadžer prodaje pesticida
+381 64 64 67 785
dejan.lepki@raiffeisen-agro.rs



Aleksandar Jurišin
Direktor prodaje semena
+381 62 64 67 23
aleksandar.jurisin@raiffeisen-agro.rs



Ivan Jokić
Regionalni menadžer - Banat
+381 62 64 60 27
ivan.jokic@raiffeisen-agro.rs



1 Dragana Štork
Menadžer prodaje
+381 62 64 62 50
dragana.stork@raiffeisen-agro.rs



2 Milan Kondić
Menadžer prodaje
+381 62 64 67 03
milan.kondic@raiffeisen-agro.rs



3 Mihajlo Carević
Menadžer prodaje
+381 62 64 62 08
mihajlo.carevic@raiffeisen-agro.rs



4 Petar Puhar
Menadžer prodaje
+381 62 64 61 81
petar.puhar@raiffeisen-agro.rs



5 Bojana Karaklajić
Menadžer prodaje
+381 62 64 63 30
bojana.karaklajic@raiffeisen-agro.rs



6 Dušan Čavić
Menadžer prodaje
+381 64 64 67 782
dusan.cavic@raiffeisen-agro.rs



7 Dušan Kovačević
Menadžer prodaje
+ 381 62 64 62 09
dusan.kovacevic@raiffeisen-agro.rs



Rada Dudarin
Trgovac merkantilnim robama
+381 64 64 67 784
rada.dudarin@raiffeisen-agro.rs




Predrag Bošnjaković
Menadžer prodaje mineralnih đubriva
+381 64 64 67 781
predrag.bosnjakovic@raiffeisen-agro.rs



Tijana Marinković
Menadžer kooperacije PJ Rumenka | Kisački put 3, 21201 Rumenka, Srbija
+ 381 62 64 67 13
tijana.marinkovic@raiffeisen-agro.rs



Ivica Cukić
Menadžer kooperacije PJ Zrenjanin | Prvomajska bb, 23000 Zrenjanin, Srbija
+381 62 646 707
ivica.cukic@raiffeisen-agro.rs



RWA

RWA Srbija d.o.o.
Bulevar Zorana Đinđića 67/17,
11000 Novi Beograd, Srbija
Tel +381 11/212 30 35, Fax +381 11/212 30 36
www.rwa.co.rs